



Am. du Sud, Bac Gé., 14 novembre 2025, sujet n°2

🔗 Exercice 1 (6 points)

► Probabilités / Loi binomiale / Bienaymé-Tchebychev

🔗 Exercice 2 (4 points)

► QCM / Espace

🔗 Exercice 3 (4 points)

► Suites / Tableur / Python

🔗 Exercice 4 (6 points)

► Dénombrement / Équations différentielles / Exponentielle



L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de la calculatrice sans mémoire « type collègue » est autorisé.

La qualité de rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.

Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.



Exercice 1 (6 points)

Dans cet exercice, tous les résultats seront arrondis à 10^{-3} près en cas de besoin.

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes l'une de l'autre.

Partie A

Au tennis, le joueur qui est au service peut, en cas d'échec lors du premier service, servir une deuxième balle.

En match, Abel réussit son premier service dans 70 % des cas. Lorsque le premier service est réussi, il gagne le point dans 80 % des cas. En revanche, après un échec à son premier service, Abel gagne le point dans 45 % des cas.

Abel est au service. On considère les événements suivants :

- S : « Abel réussit son premier service »
- G : « Abel gagne le point ».

1. Décrire l'événement \bar{S} puis traduire la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer $P(S \cap G)$.
3. Justifier que la probabilité de l'événement G est égale à 0,695.
4. Abel a gagné le point. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi son premier service?
5. Les événements S et G sont-ils indépendants? Justifier.

Partie B

À la sortie d'une usine de fabrication de balles de tennis, une balle est jugée conforme dans 85 % des cas.

1. On teste successivement 20 balles. On considère que le nombre de balles est suffisamment grand pour assimiler ces tests à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de balles conformes parmi les 20 testées.
 - (a) Quelle est la loi suivie par X et quels sont ses paramètres? Justifier.
 - (b) Calculer $P(X \leq 18)$.
 - (c) Quelle est la probabilité qu'au moins deux balles ne soient pas conformes parmi les 20 balles testées?
 - (d) Déterminer l'espérance de X.
2. On teste maintenant n balles successivement. On considère les n tests comme un échantillon de n variables aléatoires X_i indépendantes suivant la loi de Bernoulli de paramètre 0,85.

On considère la variable aléatoire

$$M_n = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} = \frac{X_1}{n} + \frac{X_2}{n} + \frac{X_3}{n} + \dots + \frac{X_n}{n}.$$

- (a) Déterminer l'espérance et la variance de M_n .
- (b) Après avoir rappelé l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que, pour tout entier naturel n , $P(0,75 < M_n < 0,95) \geq 1 - \frac{12,75}{n}$.
- (c) En déduire un entier n tel que la moyenne du nombre de balles conformes pour un échantillon de taille n appartienne à l'intervalle $]0,75; 0,95[$ avec une probabilité supérieure à 0,9.

Exercice 2.....(4 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Pour chaque question, une seule des trois propositions est exacte. Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la proposition choisie. Aucune justification n'est demandée.

Pour chaque question, une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

Dans toutes les questions suivantes, l'espace est rapporté à un repère orthonormé.

1. On considère la droite Δ_1 de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 4 + 2t, \text{ où } t \in \mathbb{R}, \\ z = t \end{cases}$ ainsi que la droite

$$\Delta_2 \text{ de représentation paramétrique } \begin{cases} x = -4 + s \\ y = 2 + 2s, \text{ où } s \in \mathbb{R}. \\ z = -1 + s \end{cases}$$

- (a) Les droites Δ_1 et Δ_2 sont parallèles.
- (b) Les droites Δ_1 et Δ_2 sont orthogonales.
- (c) Les droites Δ_1 et Δ_2 sont sécantes.

2. On considère la droite d de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$, où $t \in \mathbb{R}$, et le plan P d'équation cartésienne : $4x + 2y - z + 3 = 0$.

- (a) La droite d est incluse dans le plan P .
- (b) La droite d est parallèle strictement au plan P .
- (c) La droite d est sécante au plan P .

3. On considère les points $A(3; 2; 1)$, $B(7; 3; 1)$, $C(-1; 4; 5)$ et $D(-3; 3; 5)$.

- (a) Les points A , B , C et D ne sont pas coplanaires.
- (b) Les points A , B et C sont alignés.
- (c) \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{CD} sont colinéaires.

4. On considère les plans Q et Q' d'équation cartésienne respective $3x - 2y + z + 1 = 0$ et $4x + y - z + 3 = 0$.

- (a) Le point $R(1; 1; -2)$ appartient aux deux plans.
- (b) Les deux plans sont orthogonaux.
- (c) Les deux plans sont sécants avec pour intersection la droite de représentation paramétrique $\begin{cases} x = t \\ y = 7t + 4 \\ z = 11t + 7 \end{cases}$, où $t \in \mathbb{R}$.

Exercice 3.....(4 points)

On considère les suites (v_n) et (w_n) définies pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} v_0 = \ln(4) \\ v_{n+1} = \ln(-1 + 2e^{v_n}) \end{cases} \quad \text{et} \quad w_n = -1 + e^{v_n}.$$

On admet que la suite (v_n) est bien définie et strictement positive.

- Donner les valeurs exactes de v_1 et w_0 .
- (a) Une partie d'une feuille de calcul où figurent les indices et les termes des suites (v_n) et (w_n) est reproduite ci-contre.

Parmi les trois formules suivantes, choisir celle qui, saisie dans la cellule **B3** puis recopiée vers le bas, permettra d'obtenir les valeurs de la suite (v_n) dans la colonne **B**.

Formule 1	LN (-1 + 2 * EXP(B2))
Formule 2	=LN(-1 + 2 * EXP(B2))
Formule 3	=LN(-1 + 2 * EXP(A2))

	A	B	C
1	n	v_n	w_n
2	0	1,386294361	3
3	1	1,945910149	6
4	2	2,564949357	12
5	3	3,218875825	24
6	4	3,891820298	48
7	5	4,574710979	96
8	6	5,262690189	192
9	7	5,953243334	384
10	8	6,64509097	768
11	9	7,337587744	1536
12	10	8,030409562	3072
13	11	8,723394022	6144
14	12	9,416459832	12288
15	13	10,10956633	24576
16	14	10,80269316	49152
17	15	11,49583017	98304
18	16	12,18897226	196608
19	17	12,8821169	393216

- Conjecturer le sens de variation de la suite (v_n) .
 - À l'aide d'un raisonnement par récurrence, valider votre conjecture concernant le sens de variation de la suite (v_n) .
- (a) Démontrer que la suite (w_n) est géométrique.
 - En déduire que pour tout entier naturel n , $v_n = \ln(1 + 3 \times 2^n)$.
 - Déterminer la limite de la suite (v_n) .
- Justifier que l'algorithme suivant, écrit en langage Python, renvoie un résultat quel que soit le choix de la valeur du nombre **S**.

```

</> Code Python

from math import log as ln
from math import exp

def seuil(S) :
    V = ln(4)
    n = 0
    while V < S :
        n = n + 1
        V = ln(2 * exp(V) - 1)
    return(n)

```

Exercice 4.....(6 points)

Partie A : Dénombrement

On considère l'ensemble des nombres entiers relatifs non nuls compris entre -30 et 30 ; cet ensemble peut s'écrire ainsi : $(-30; -29; -28; \dots; -1; 1; \dots; 28; 29; 30)$. Il comporte 60 éléments.

On choisit successivement et sans remise un entier relatif a puis un entier relatif c .

- Combien de couples $(a; c)$ différents peut-on ainsi obtenir?

On considère l'événement M : « l'équation $ax^2 + 2x + c = 0$ possède deux solutions réelles distinctes », où a et c sont les entiers relatifs précédemment choisis.

- Montrer que l'événement M a lieu si et seulement si $ac < 1$.
- Expliquer pourquoi l'événement contraire \overline{M} comporte 1 740 issues.
- Quelle est la probabilité de l'événement M ? On arrondira le résultat à 10^{-2} .

Partie B : Équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 10y = (30x^2 + 22x - 8)e^{-5x+1}$ où $x \in \mathbb{R}$ et y est une fonction définie et dérivable sur \mathbb{R} .

- Résoudre sur \mathbb{R} l'équation différentielle : $y' + 10y = 0$.
- Soit la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = (6x^2 + 2x - 2)e^{-5x+1}$. On admet que f est dérivable sur \mathbb{R} et on note f' sa dérivée.

Justifier que f est une solution particulière de (E).

- Donner l'expression de toutes les solutions de (E).

Partie C : Étude de fonction

On propose d'étudier dans cette partie la fonction f rencontrée à la question partie B.2.. On rappelle que, pour tout réel x , $f(x) = (6x^2 + 2x - 2)e^{-5x+1}$.

On note f' la fonction dérivée de la fonction f . On appelle \mathcal{C}_f la courbe représentative de f dans un repère du plan.

- On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. Déterminer la limite de la fonction f en $-\infty$.
- En utilisant la partie A, montrer que \mathcal{C}_f coupe l'axe des abscisses en deux points (*les coordonnées de ces points ne sont pas attendues*).
- En utilisant les parties A et B, montrer que \mathcal{C}_f possède deux tangentes horizontales.
- Dresser le tableau de variation complet de la fonction f .
- Déterminer en justifiant le nombre de solution(s) de l'équation $f(x) = 1$.
- Pour tout réel m strictement supérieur à 0,2, on définit I_m par $I_m = \int_{0,2}^m f(x) dx$.
 - Vérifier que la fonction F définie sur \mathbb{R} par $F(x) = \left(-\frac{6}{5}x^2 - \frac{22}{25}x + \frac{28}{125}\right)e^{-5x+1}$ est une primitive de la fonction f sur \mathbb{R} .
 - Existe-t-il une valeur de m pour laquelle $I_m = 0$? Interpréter graphiquement ce résultat.